

PAKENDI INFOLEHT
Prasikvanteel, 56,80 mg/ml süstelahus koertele ja kassidele

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes veterinaararsti soovitusel.

1. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml süstelahust sisaldab:

Toimeaine:

Prasikvanteel 56,8 mg

2. LOOMALIIGID

Koer ja kass.

3. NÄIDUSTUS(ED)

Koer: *Dipylidium caninum*, *Taenia pisiformis*, *Echinococcus granulosus* ja *Echinococcus multilocularis* infestatsiooni ravi.

Kassid: *Taenia taeniaeformis* ja *Dipylidium caninum* infestatsiooni ravi.

4. VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole teada.

5. KÕRVALTOIMED

Suured süstelahuse kogused võivad subkutaanse manustamise puhul esile kutsuda lokaalseid ärritusnähte.

6. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Intramuskulaarseks või subkutaaneks manustamiseks.

Echinococcus spp nakkuse korral tuleks eelistada intramuskulaarset manustamist.

Kass ja koer: 0,1 ml/kg kehamassi kohta üks kord, mis vastab 5,7 mg prasikvanteelile 1 kg kehamassi kohta.

Subkutaanse manustamise korral ei tohiks ühte manustamiskohta süstida rohkem kui 3 ml ravimit.

7. KEELUAEG

Ei rakendata.

8. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitustingimusi vaata pakendilt.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu

viimasele päevale - vaata pakendilt.

9. ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Hoiduda tuleb järgnevatest tegevustest, kuna need suurendavad riski ravimresistentsuse väljakujunemiseks ning võivad tulemusena põhjustada ravi mittetoimimist:

- liiga sage ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine pikema perioodi vältel;
- alaannustamine, mis võib olla tingitud looma kehamassi ebaõigest hindamisest, ravimi annustamisveast või annustamisvahendi (kui on) puudulikust kalibreerimisest.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida alaannustamist.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimesed, kes on prasikvanteeli suhtes ülitudlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Vältida ravimi juhuslikku iseendale süstimist. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Pärast kasutamist pesta käed.

Tiinus ja laktatsioon

Võib kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Deksametasooni samaaegne manustamine võib põhjustada prasikvanteeli plasmakontsentratsiooni vähenemist.

10. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsi oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

11. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Veebruar 2019

12. LISAINFO

Müügiloata ravim